

PARANIT



Pirms ārstēšanas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Par galvas utīm

Galvas utis ir sīks kukainis bez spāriem, kas dzīvo tikai matos un pārtiek no asinīm. Tā kustas, izmantojot 3 kāju pārus, kas tai ļauj piekļerties matiem. Pieauguši utis ir 3-4 mm gara un dzīvo aptuveni 30 dienas. Utu mātīte dzīves laikā var izdēt 200 līdz 300 olšņas. Tas pēc 7 dienām izšķīļš un kukainis pieaug 10 dienu laikā. Ēdot utis galvas ādā ievada siekalas, kas var izraisīt paaugstinātas jutības reakciju un raīdīt stipru niezi un iekaisumu. Diagnozi apstiprina, rūpīgi pārmeklējot matus, lai atrastu utis vai gnidas, kas ir vieglāk pamanāmas.

Par Paranit aerosolu

Paranit aerosols ir klīniski pārbaudīts un ir pierādīts, ka tas ir efektīvs ārstēšanas līdzeklis pret galvas utīm: tā sastāv ar dubulto iedarbību ne vien nosmacē, bet arī atūdeņo galvas utis un gnidas. Tā kā Paranit aerosols nesatur insekticīdus, galvas utīm nevar attīstīties rezistence pret tā sastāvdaļām.

Kā lietot Paranit aerosolu?

Jums tikai soli pa solim jāizpilda turpmākie norādījumi.

1. solis: pārliecinieties par galvas utu klātbūtni

Ar smalko (Paranit) utu ķemmi rūpīgi pārbaudiet, vai matos nav pieaugušu kukaņu vai gnīdu, vislabāk to darīt dienas gaismā. Lai nepieļautu atkārtotu invāziju, visus cilvēkus, kuriem ir galvas utis, ārstējiet vienā dienā.

- Vieglāk ir pārbaudīt sausus matus.
- Vispirmis izķemmējiet matus, lai tie nebūtu sapinušies, un pēc tam secīgi pārbaudiet katru matu šķipsnu.
- Pārbaudiet matu saknes, aiz ausīm un pakausī - šajās vietās bieži var atrast utis un gnidas.
- Lai nepieļautu nekādu atkārtotu invāziju, pēc katras lietošanas reizes rūpīgi izmazgājiet ķemmi remdenā ziepjūdenī.

2. solis: uzsmidziniet Paranit aerosolu

Tuot aerosola pudelīti apmēram 10 cm attālumā, sausus matus uzmanīgi un vienmērīgi apsmidziniet ar pietiekamu Paranit šķīduma daudzumu. Obligāti pārklājiet visus matus un galvas ādu. Iemasējiet matos, sākot no saknēm līdz galiem, īpaši uzmanību pievēršot kaklam un rajonam aiz ausīm. Atstājiet uz 15 minūtēm. Tas ir ļoti svarīgi, lai ārstēšana būtu sekmīga.

100 ml = līdz 4 lietošanas reizēm atkarībā no matu garuma.

3. solis: izmazgājiet matus

Nesamīrīnātiem matiem uzklājiet pieteikami daudz pēc ārstēšanas lietojamā Paranit šampūna vai parastā šampūna un pārliecinieties, ka tiek pilnībā pārklāti visi mati. Tad samīrīniet matus, lietojot nesaudu ūdens, lai rastos putas. Izskalojiet aerosolu no matiem ar siltu ūdeni (nelietojiet aukstu ūdeni).Mazgāšanu atkārtojiet, ja lietojāt parasto šampūnu.

4. solis: izķemmējiet no matiem utis un gnidas

Pirms matu žāvēšanas ar smalko (Paranit) utu ķemmi izķemmējiet arī utis un gnidas.

- Mitrus matus izķemmējiet ar smalko utu ķemmi.
- Matus sadaliet 4 zonās: no pieres līdz pakausim un pēc tam no vienas auss līdz otrai. Ja mati ir gari, katrā daļā tos var sapīt.
- Apstrādājiet katru zonu, atdalot pa sikai matu šķipsnai, lai būtu redzama galvas āda.
- Izķemmējiet katru matu šķipsnu, sākot pēc iespējas tuvāk galvas ādai.
- Ar ķemmes palīdzību izņemiet katru atrasto uti un/vai gnidu.
- Katru matu šķipsnu, kurā nav utis, var pārīkļ uz vienu pusī.
- Lai novērstu viedmādu atkārtotu invāziju, pēc katras matu šķipsnas apstrādes notīriet ķemmi ar vates spilventiņu vai bumbiņu un vienmēr ķemmējiet matus virzienā no galvas augšdaļas uz leju.

5. solis: ja nepieciešams, ārstēšanu atkārtojiet pēc 7 dienām

Pēc 7 dienām atkal pārbaudiet sausus matus, vai tajos nav utis. Ja nepieciešams, ārstēšanu atkārtojiet. Ārstēšanas kursu var droši atkārtot vairākas reizes.

Neaizmirstiet attīrīt apkārtni

Mazgājot 60°C temperatūrā, iztīriet apģērbu, gultasveļu, dvieļus un citus priekšmetus (sukas, ķemmes u.c.), kuri tieši saskārušies ar galvu. Ar putekļsūcēju rūpīgi iztīriet māju un automašīnu, putekļsūcēja maisīnu pēc tam izmetiet. Jūs varat arī atstāt visus priekšmetus noslēgtā maisnīā 2 līdz 3 dienas, jo galvas utis nevar izdzīvot bez barības.

Svarīga piezīme

Galvas utīm nevar attīstīties rezistence pret Paranit aerosolu, jo tā iedarbība nav saīstīta ar ķīmiskām vielām. Tomēr ārstētās personas var attīstīt inficēties ar utīm no neārstētiem cilvēkiem (piemēram, skolā). Šādā gadījumā jūs droši varat atkārtoti lietot Paranit, un tas joprojām būs efektīvs.

Bridinājumi pirms lietošanas: *Nelietot šo produktu:*

- cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām / • bērniem līdz 6 mēnešu vecumam.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Rūpniecēm Paranit aerosols nav kontrindicēts. Tomēr grūtniecības laikā vai barošanas ar krūti periodā pirms produkta lietošanas vienmēr konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Piesardzība

Tikai ārīgai lietošanai. Ja preparāts nejauši norīts, konsultējieties ar ārstu vai toksikoloģijas centru. Izvairieties no jebkādas preparāta saskarses ar acīm un gļotādām (muti, degunu). Ja preparāts iekļuvis acīs, rūpīgi izskalojiet ar tīru ūdeni. Nelietot, ja jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām, ja parādās izsitumi, kairinājums vai paaugstināta jutība, nekavējoties pārtrauciet ārstēšanu un izmazgājiet matu ar savu parasto šampūnu.

Iespējamās blakusparādības

Nieze un kairinājums ap acīm. Galvas ādas zvinošanās.

Kontakta kairinājums un galvas ādas, ausu vai kakla apsārtums.

Uzglabāšana

- Uzglabāt sausā vietā, istabas temperatūrā. / • Nelietot, ja beidzies uz pudelītes norādītais derīguma termiņš. / • Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Sastāvs

Minerāleļļa un dimetokons.

Ražotājs

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Beļģija

Izplatītājs

Richard Bittner AG, Reiserstraße 55-57, A 1030 Viena, Austrija

www.paranix.eu



Atidzīai perskaitykite informacinį lapelį prieš pradėdami gydymą.

Apie galvos utėles

Galvos utėlė – tai mažas besparnis vabzdys, gyvenantis tik plaukuose ir mintantis krauju. Ji juda 3 poromis kojų, kuriomis ji prisitvirtina prie plauko. Suaugusi utėlė yra 3-4 mm ilgio ir gyvena apie 30 dienų. Utėlių patelės per savo gyvenimą padeda nuo 200 iki 300 kiaušinėlių (glīndų). Jie prasikala po 7 dienų, o subręsta per 10 dienų. Besimaitindama utėlė į galvos odą suleidžia seilių, galinčių sukelti padidinto jautrumo reakciją, dėl ko atsiranda stiprus niežulys ir sudirginimas. Diagnozę galima patvirtinti patikrinus plaukus, ieškant utėlių ar glīndų, kurios yra lengviau pastebimos.

Apie Paranit purškala

Paranit purškalas - klīniskai patikrintas, galvos utėlių gydymo veiksmingumas įrodytas. Tai dvigubo poveikio priemonė, ne tik uždušinanti, bet ir išdžiovinanti galvos utėles ir glīndas. Paranit purškale nėra insekticidų, todėl galvos utėlės negali tapti atsparios sudėtinėms dalims.

Kaip naudoti Paranit purškala?

Viskas, ką turite padaryti, tai nuosekliai vadovautis toliau pateiktomis instrukcijomis.

Žingsnis Nr. 1: patikrinkite ar yra galvos utėlių

Kruopščiai patikrinkite kiekvieno šeimos nario plaukus tankiomis (Paranit) šukomis nuo utėlių, patartina dienos šviesoje. Visus, užsikrėtusius utėlėmis, gydykite tą pačią dieną, kad išvengtumėte pakartotinio užsikrėtimo.

- Lengviau tikrinti sausus plaukus.
- Pirmiausia iššukuokite susivelisčius plaukus, tuomet tikrinkite plaukų sruogą po sruogos.
- Patikrinkite plaukų šaknis, plotus už ausų ir sprando sritį, utėlės ir glīndos dažniausiai randamos šiose vietose.
- Siekiant išvengti papildomo užsikrėtimo, po kiekvieno naudojimo būtina kruopščiai išplauti šukas drungnu muiluotu vandeniu.

Žingsnis Nr. 2: užpurškite Paranit

Purškala laikykite maždaug 10 cm atstumu nuo plaukų ir tolygiai apipurškite sausus plaukus pakankamu Paranit kiekiu. Įstikinkite, kad pasidengė visi plaukai ir galvos oda. Gerai įmasažuokite nuo šaknų iki galiuku, atkreipdami ypatingą dėmesį į sprando sritį ir plotus už ausų. Palikite 15 minučių. Tai būtina sėkmingam gydymui.

100 ml = iki 4 kartų, priklausanai nuo plaukų ilgio.

Žingsnis Nr. 3: išplaukite plaukus

Panaudojus, užplikite pakankamą kiekį Paranit arba įprasto šampūno ant sausų plaukų ir tolygiai paskirstykite. Dabar kruopščiai išplaukite ir išskalaukite vandeniu (venkite naudoti šaltą vandenį). Naudojant įprastą šampūną, plovimo procedūrą pakartokite.

Žingsnis Nr. 4: pašalinkite utėles ir glīndas

Prieš džiovinant plaukus, tankiomis (Paranit) šukomis nuo utėlių, pašalinkite utėles ir glīndas.

- Tankiomis šukomis nuo utėlių iššukuokite šlapius plaukus.
- Padalykite plaukus į 4 dalis: nuo kaktos iki sprando, o tuomet nuo vienos ausies iki kitos. Jeigu plaukai ilgi, kiekvieną dalį galite surišti.
- Kiekvieną dalį suskirtykite plonomis plaukų sruogomis taip, kad matytųsi galva.
- Iššukuokite kiekvieną plaukų sruogą, pradėdami kiek įmanoma arčiau galvos.
- Šukomis pašalinkite kiekvieną rasta utėlę ir/arba glīndą.
- Kiekvieną išvalytą plaukų sruogą atidėkite atskirai į vieną pusę.
- Siekiant išvengti pakartotinio užkrėtimo, vatos gabalėliu ar tamponu kaskart išvalykite šukas ir visuomet šukuokite nuo plaukų šaknų iki plaukų galiuku.

Žingsnis Nr. 5: prireikus, gydymą pakartokite po 7 dienų

Po 7 dienų vėl patikrinkite sausus plaukus, ar nėra utėlių. Prireikus, gydymą pakartokite dar kartą. Nepavojinga naudoti kelis kartus.

Nepamirškite nukenksminti aplinką.

Nukenksminkite rūbus, patalynę bei rankšluosčius ir kitus daiktus (šepetėlius, šukas ir kt.), kurie tiesiogiai lietėsi su galva, išskalbdami juos 60°C temperatūroje. Kruopščiai išsiurbkite namus ir automobilį, o dulkių siurblo mašėlę - išmeskite. Jūs taip pat galite visus daiktus palikti uždarame krepšyje 2 ar 3 dienoms, nes galvos utėlės neišgyvens negalėdamos maitintis.

Svarbi pastaba

Galvos utėlės negali įgauti atsparumo Paranit purškalui, nes jis neturi cheminio poveikio. Tačiau įmanoma, kad išgydyti žmonės gali vėl užsikrėsti utėlėmis nuo kitų asmenų (pvz., mokykloje). Tokiu atveju, vėl galima naudoti Paranit be jokio pavojaus, jis vis tiek bus veiksmingas.

Atsargumo priemonės prieš pradėdant naudoti: *Nenaudokite:*

- jei esate alergiškas bet kuriai sudėtinėi daliai / • jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams.

Nėštumas ir žindymas

Paranit purškalo naudojimo kontraindikacijų neščioms moterims nėra. Tačiau, prieš naudojant preparatą nėštumo ir žindymo laikotarpiu visuomet rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Išėjimas

Tik išoriniam naudojimui. Atsitiktinai nurijus kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų centrą. Vengti patekimo į akis ir ant gleivinių (burnos, nosies). Patekus į akis, gausiai praplauti vandeniu. Nenaudokite, jei esate alergiškas bet kuriai sudėtinėi daliai. Pasireiškus bėrimui, sudirginimui ar padidėjusiam jautrumui, nedelsiant nutraukite gydymą ir išplaukite plaukus įprastu šampūnu.

Galimas šalutinis poveikis

Niežulys arba sudirginimas aplink akis. Galvos odos pleiskanajimas.

Kontaktnis sudirginimas, galvos odos, ausų ar sprando paraudimas.

Laikymas

- Laikyti sausroje vietoje, kambario temperatūroje. / • Negalima naudoti pasibaigus ant buteliuko nurodytam galiojimo laikui. /
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Sudėtis

Mineralinis aļiejus ir dimetikonas.

Gamintojas

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Beļģija

Platintojas

Richard Bittner AG, Reiserstraße 55-57, A 1030 Viena, Austrija

www.paranix.eu



Lugege enne toote kasutamist põhjalikult pakendi infolehte.

Peatäide

Peatäi on väike tiivutu putukas, kes elab vaid juustes ning toitub verest. Peatäi kasutab liikumiseks 3 jalapaari, mis võimaldavad tal ennast juuste külge kinnitada. Täiskasvanud täi on 3-4 mm pikkune ja elab ligikaudu 30 päeva. Emane täi muneb selle aja jooksul 200 kuni 300 muna. Tinguud kooruvad 7 päevaiga ning saavad täiskasvanuks 10 päevaiga. Toitudes eritavad täid peanahka sülgel, mis võib põhjustada lülitundlikkuse reaktsiooni, mis väljendub tugeva sügeluse ja ärritusena. Diagnoos kinnitatakse läbi põhjaliku juuste läbivaatuse, mille käigus otsitakse täide või kergetimmi märgatavate tingude esinemist.

Paranit spreit

Paranit spreit on kliiniliselt testitud ning tõestatud efektiivne täitõve ravimisel: selle topeeltoimega koostis mitte ainult ei lammata, vaid ka kuivatab peataisid ja tinge. Kuna Paranit spreit ei sisalda putukamürke, ei kujune peatäide selle koostisosade suhtes resistentsust.

Kuidas Paranit spreid kasutada?

Kõik mida tegema peate, on alpool toodud juhiste samm-sammult järgimine.

Samm nr. 1: kontrollige peatäide olemasolu

Kasutage peenepiilist (Paranit) täikammi, et põhjalikult kontrollida iga pereliikme juukseid, soovitatavalt päevavalguses. Ravige kõiki, kellelt leidsite peatäisid, samal päeval, et vältida taasnakatamist.

- Kuivi juukseid on lihtsam kontrollida.
- Emsalt kammige juukseid sõlmede eemaldamiseks, seejärel kontrollige juukseid salkhaaval.
- Kontrollige juuksejuuri, kõrvade taguseid ning kukalt - tihti peale leitakse just nendest piirkondadest täisid ja tinge.
- Puhastage kamm peale iga kasutuskorda leiges seebivees, et vältida edasist nakatumist.

Samm nr. 2: kandke peale Paranit spreit

Hoidke spreid ligikaudu 10 cm kaugusel juustest ning puhustage ettevaatlikult piisavas koguses Paranit lahust ühtlaselt kuivadele juustele. Hoolditsege selle eest, et katate kõik juukseid ja peanaha. Masseerige hoolikalt juurtest juukseosteni, pöörates erilist tähelepanu kaelale ja kõrvade tagusele alale. Laske toimida 15 minutit. See on eduka ravi eesmärgil oluline.

100 ml = kuni 4 kasutuskorda, olenevalt juuste pikkusest.

Samm nr. 3: peske juukseid

Kandke otsele kuivadele juustele piisav kogus Paranit ravijärjrgset šampooni või tavalist šampooni ning hoolditsege selle eest, et kõik juukseid saaksid šampooniga kokku. Lisage veidi vett ja peske põhjalikult. Loputage juukseid sooja veega (võib olla külma vee kasutamist). Korralge pesu juhul, kui kasutasite tavalist šampooni.

Samm nr. 4: eemaldage täid ja tingud

Enne juuste kuivatamist kasutage peenepiilist (Paranit) täikammi, et eemaldada täid ja tingud.

- Kammige märgjad juukseid peenepiilise täikammiga.
- Jootage juukseid 4 sektsiooni: otsmikust kuklani ning seejärel ühest kõrvast teiseni. Pikkade juuste puhul võite iga sektsiooni patsi siduda.
- Töödelge iga sektsiooni, eraldades väikesed juuksesalgud sedasi, et peanahk oleks nähtav.
- Kammige iga juuksesalku, alustades peanahale võimalikult lähedalt.
- Kammi kasutades eemaldage iga leitud täi ja/või ting.
- Iga tinguvaba juuksesalk tuleks asetada ühele küljele.
- Vältimaks mistahes taasnakatamist, puhastage kamm peale iga juuksesalku vatipadjakese või -palliga ning kammige alati suunaga pealaest allapoole.

Samm nr. 5: korrake vajaduse korral ravi 7 päeva möödudes

Kontrollige 7 päeva pärast kuivadeist juustest täide olemasolu. Vajaduse korral korrake ravi. Ravi mitmekordsel kordamisel ei esine mistahes riske.

Ärge unustage puhastada ümbritsevat keskkonda

Puhastage riided, voodilinnad ja rätikud ning muud esemed (harjad, kammid jne.) mis olid otseses kontaktis peaga, pestes need vähemalt 60°C juures. Puhastage eluruumid ja auto hoolikalt tolmimeijaga ning seejärel visake tolmimeija tolmikott minema. Esemeid võib panna ka 2...3 päevaks suletud kotti, sest peatäi hakkub ilma toiduta.

Oluline märkus

Peatäidel ei saa tekkida Paranit spreit vastu resistentsust kuna sellel on mitte-keemiline toimemehhanism. Samas on võimalik, et tootega ravitud inimesed nakatuvad peatäidesse uuesti teiste, ravimata isikute kaudu (näiteks koolis). Sellisel juhul võite Paranit'i riskivabalt uuesti kasutada ning see on endiselt efektiivne.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist: Ärge kasutage toodet:

• inimestel, kes on toote mistahes koostisosade suhtes allergilised / • alla 6 kuu vanustel lastel.

Rasedus ja imetamine

Paranit spreit kasutamine ei ole rasedatele vastunäidustatud. Samas on enne toote kasutamist rasedatel või imetavatel emadel alati soovitatav konsulteerida arsti või apteikriga.

Ettevaatus

Äinult välispidiseks kasutamiseks. Toodet kogemata suukaudu manustades konsulteerige arsti või mürgistusteaabekeskusega. Vältige kontakti silmadega ning limaskestadega (suu, nina). Silmadega kokupuutel loputage põhjalikult puhta veega. Ärge kasutage toodet kui olete mõne koostisosa suhtes allergiline. Lööbe, ärrituse või ülitundlikkuse korral katkestage ravi koheselt ning peske juukseid oma tavapärase šampooniaga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Sügelus ja ärritus silmade ümbruses. Peanaha kestendamine.

Kontaktärritus ja punetus peanahal, kõrvadel või kaelal.

Säilitamine

• Säilitage kuivas kohas ja toatemperatuuril. / • Ärge kasutage pärast pudelilt toodud kõlblikkusaja möödumist. / • Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Koostis

Mineraalõli ja dimetikoon.

Tootja

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgia

Levitaja

Richard Bittner AG, Reiserstraße 55-57, A 1030 Vienna, Austria

www.paranix.eu



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом лечения.

О головных вшах

Головная вошь - это маленькое бескрылое насекомое, которое живет исключительно в волосном покрове головы и питается кровью. У вши 3 пары ног, с помощью которых она передвигается и удерживается на волосах. Взрослая особь в длину составляет 3-4 мм и живёт около 30 дней. Самка в течение жизни откладывает от 200 до 300 яиц (гнид). Через 7 дней из гнид вылупляются личинки и через 10 дней они становятся взрослыми особями. При укусах вши вводят в кожу головы слюну, которая может вызвать аллергическую реакцию, включая сильный зуд и раздражение. Диагноз можно подтвердить при тщательной проверке волос на наличие вшей или гнид, которых легче обнаружить.

О Паранит спрее

Paranit спрей прошёл клинические исследования, которые подтвердили его эффективность при лечении головных вшей: его двойная формула действия не только удашает, но и обезвоживает головных вшей и гнид. Paranit спрей не содержит инсектицидов, поэтому устойчивость к его компонентам у головных вшей не развивается.

Как использовать Паранит спрей?

Все, что Вам необходимо, это пошагово следовать инструкции, указанной внизу.

Шаг 1: Проверьте наличие головных вшей

С помощью расчески с частым гребнем (Паранит) для вычесывания вшей, которая входит в комплект, тщательно проверьте волосы каждого члена семьи, желательно при дневном свете. Лечение членов семьи, у которых были обнаружены головные вши, необходимо начать в один день, чтобы избежать повторного заражения.

- Легче проверять сухие волосы.
- Сначала расчешите волосы, чтобы удалить колтуны, затем прядь за прядью проверьте волосы.
- Внимательно обследуйте корни волос, а так же за ушами и в нижней части затылка, в этих областях наиболее часто можно обнаружить вшей и гнид.
- После каждого применения тщательно промывайте гребень в теплой, мыльной воде, чтобы избежать дальнейшего заражения.

Шаг 2: Нанесите Паранит спрей

На расстоянии около 10 см от волос осторожно распылите необходимое количество средства Паранит на сухие волосы. Распределите средство на всю длину волос и кожу головы. Хорошо помассируйте волосы от корней до кончиков, обращая особое внимание на область шеи и за ушами. Оставьте средство на волосах на 15 минут. Это важно для успешного лечения.

100 мл = до 4 обработок, в зависимости от длины волос.

Шаг 3: Вымойте волосы

Нанесите достаточное количество специального Паранит шампуня для использования после лечения или обычного шампуня до увлажнения волос и распределите шампунь по волосам. Затем намочите волосы и добавьте еще шампуня. Смойте спрей, используя теплую воду (избегайте использования холодной воды). Повторите процедуру, если вы использовали обычный шампунь.

Шаг 4: Удалите вшей и гнид

Перед тем как высушить волосы, удалите вшей и гнид с помощью (Paranit) расчески с частым гребнем для вычесывания вшей.

- Расчешите мокрые волосы расческой с частым гребнем для вычесывания вшей.
- Разделите волосы на 4 секции: от лба до основания шеи и от одного уха до другого. В случае длинных волос каждую секцию закрепите или заплетите в косу.
- Обработайте каждую из выделенных секций, отделяя мелкие пряди так, чтобы кожа головы хорошо просматривалась.
- Прочешите каждую прядь волос, начиная максимально близко к коже головы.
- Используя гребень, удалите всех найденных вшей и/или гнид.
- Каждую очищенную от гнид прядь волос перемещайте на одну сторону.
- Для избежания повторного заражения, очищайте гребень после прочесывания каждой пряди с помощью ватных дисков или ватных шариков, и всегда прочесывайте каждую прядь от корней до кончиков волос.

Шаг 5: Повторите лечение через 7 дней

Через 7 дней проверьте сухие волосы на наличие головных вшей. Повторите лечение, если необходимо. Риски при повторении многократной обработки отсутствуют.

Не забудьте провести дезинсекцию

Обработайте одежду, простыни, полотенца и другие предметы (щетки, гребни и т.д.), которые были в непосредственном контакте с волосами, постирав при температуре 60°C. Необходимо аккуратно пропылесосить дом и автомобиль, затем выбросить мешок из пылесоса. Вы так же можете сложить все вещи в закрытый мешок на 2-3 дня, так как головные вши не могут выжить без питания.

Важное примечание

Так как Паранит спрей обладает нехимическим способом действия, у головных вшей не развивается устойчивость к средству. Однако, после уничтожения вшей, есть риск повторного заражения от других людей, не прошедших обработку (например, в школе). Если это произойдёт, Вы сможете без риска снова воспользоваться Паранитом и он будет так же эффективен.

Предупреждение перед использованием: Не используйте данное средство:

• для людей с индивидуальной непереносимостью какого-либо из компонентов / • для детей до 6 месяцев.

Беременность и кормление грудью

Противопоказаний в применении Паранит спрея для беременных женщин не имеется. Однако, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, если средство будет использовано для беременной или кормящей грудью женщины.

Меры предосторожности

Только для наружного применения. Проконсультируйтесь с врачом или центром по отравлениям в случае случайного попадания в кишечно-желудочный тракт. Избегайте попадания в глаза и на слизистые оболочки (рта, носа). В случае попадания в глаза, тщательно промойте чистой водой. Не используйте в случае аллергии на какие-либо компоненты средства. В случае аллергической реакции, раздражения или сверхчувствительности, немедленно прекратите обработку и вымойте голову своим обычным шампунем.

Возможные побочные эффекты

Зуд и раздражение вокруг глаз. Образование перхоти на коже головы. Раздражение и покраснение при контакте с кожей головы, ушей или шеи.

Хранение

• Хранить средство в сухом месте при комнатной температуре. / • Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке. / • Хранить в недоступном для детей месте.

Состав

Минеральное масло и диметикон.

Производитель

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgia

Распространитель

Richard Bittner AG, Reiserstraße 55-57, A 1030 Vienna, Австрия

www.paranix.eu

